

Unité Chirurgicale de la Face et du Cou Oto - Rhino - Laryngologie Chirugie et Médecine Esthétique

Consentement éclairé EPILATION :

Laser Clarity II: Alexandrite / Nd: Yag

1. Principe de l'épilation Laser

L'énergie lumineuse laser, monochromatique est absorbée par la mélanine, transformée en chaleur au niveau de cette cible et transmise le long de la tige pilaire jusqu'au fond du follicule pileux.

Le but est en de détruire par la chaleur les structures germinatives profondes (bulbe et bulge) du poil de façon qu'il ne puisse plus repousser et cela sélectivement sans endommager les autres structures de la peau.

Entre les séances laser, il ne faut donc **plus d'épilation à la cire ou à la pince**, qui enlèvent cette tige. On peut cependant raser la zone ou utiliser des ciseaux qui laissent la tige pilaire dans le follicule.

Les poils en phase anagène, de croissance, sont les plus sensibles à l'effet du traitement laser car ils sont à cette phase plus riche en mélanine. Ils ne représentent malheureusement qu'en moyenne 15 à 30 % des poils dans une zone donnée à un temps donné. Pour obtenir de bons résultats, il faut donc répéter les séances en les espaçant pour couvrir tous les poils sur un cycle pilaire entier.

En général on traite les patients toutes les 4 à 12 semaines en fonction des zones. En moyenne le traitement d'attaque nécessite entre 6 et 8 séances.

Le nombre total de séances dépend de la couleur de la peau, de la zone traitée et du respect des recommandations de votre médecin.

2. Contre-indications et principe de précaution au traitement laser:

- Exposition solaire récente
- Séances d'UV, application d'auto bronzants
- Prise de Beta carotène (sous toutes ses formes)
- Alexandrite : Peaux bronzées, tannées
- Grossesse*
- Peau lésée, déshydratée, fragilisée, infectées
- Sauna, Hammam, gommages
- Application d'huiles essentielles (15 jours avant la séance)
- Peeling chimique/mécaniques récents
- Implants métalliques sur la zone à traiter (broches, vis...)

- Appareils dentaires métalliques sur les dents
- Tatouages Maquillage permanent, semi permanent
- Teintures de vêtement sur la peau
- Pathologies entrainant un trouble de la cicatrisation
- Vitiligo
- Herpès (traitement des zones génitales et péri orales)
- Poils roux, blancs (inefficacité)

Je reconnais avoir pris connaissance des contre-indications au traitement laser Clarity II et je certifie l'exactitude de mes réponses. Je m'engage à prévenir le médecin si mon état venait à évoluer.

Tout le personnel dans la pièce de traitement, moi inclus, porteront des protections oculaires pour prévenir une atteinte oculaire de cette lumière intense.

3. Résultats attendus

L'épilation laser permet de supprimer de 80 % à 98 % des poils terminaux sur les zones traitées.

Attention ! l'épilation laser n'est jamais complète. Plus on commence jeune ◀▶ Plus il reste de poils

- La durée du traitement est d'un cycle pilaire (7 à 18 mois).
- Le nombre de séances diminue avec l'âge.

Le résultat final sera constaté environ 12 mois après la dernière séance.

Ce résultat est définitif, sauf s'il existe des causes susceptibles d'augmenter la pilosité sur tout votre corps : arrêt ou prise de certains médicaments, prise de poids importante, changement hormonal, maladie rares, grossesse (ventre et bas du visage).

Sur le menton et le bas du visage des poils peuvent apparaître toute la vie : l'épilation n'est pas définitive sur ces zones.

Dans environ 1% des cas, non prévisibles, l'épilation laser :

- n'est pas définitive, sans explication connue,
- n'est pas efficace, sans explication connue.

4. Limites de l'épilation laser.

Les résultats du traitement des poils blonds et du duvet sont imprévisibles. L'épilation laser est inefficace sur les poils blancs et les "vrais" poils roux.

Les délais entre deux séances doivent être respectés :
4 semaines au moins et pas plus de 12 semaines **

(** proposés en l'état de la science (J.R. Lloyd 2000 et 2002).

Les résultats peuvent être mauvais ou très mauvais :

- en cas de douleur et/ou de mouvements excessifs durant la séance, de dépassement des délais entre séances, ou de bronzage durant le traitement¹,
- en cas d'acné tardive (après 20 ans) et/ou rebelle,
- en cas d'obésité, ou de prise de poids importante,
- en cas d'immaturité du système pilaire (moins de 18 ans chez les femmes, moins de 45 ans chez les hommes),
- sur la pilosité du visage,
- sur les zones à risque de stimulation paradoxale,
- sur les poils profonds (genoux, coudes),

¹ Bronzage durant le traitement, délais entre séances non respectés, dose efficace atteinte progressivement (peau mate ou bronzée), balayage du laser irrégulier (mouvements fréquents du patient).

- trouble de la fertilité, trouble hormonal,
- prise au long cours de corticoïdes ou d'anabolisants,
- hyperpilosité congénitale ou éthnique.
- Pilosité très claire, poils fins

Des progrès visibles doivent s'observer dès la 4ème séance!

Si ce n'est pas le cas, interrompez votre traitement, même si vous estimez qu'il n'est pas fini. Vous pourrez le reprendre quand votre statut hormonal sera devenu plus favorable.

Si vous poursuivez le traitement sans progrès visible entre les séances les résultats ne seront pas améliorés significativement

5. Effets secondaires

Comme toutes techniques, je comprends que des effets secondaires au traitement sont possible :

Effets normaux après traitement :

(ou responsable légal)

- apparition autour de chaque poil d'œdèmes (gonflements) qui persistent quelques heures : c'est une preuve d'efficacité.
- rougeurs, gêne ou sensibilité de la peau persistant de un à trois jours.

Effets secondaires fréquents et trans	sitoires :
	t bénin si vous appelez le médecin et si vous suivez scrupuleusement sa prescription
pour éviter toute complication (interd	
☐ Ces brûlures courantes (1 ^{er} et 2 nd de entrainent :	legré superficiel) soignées sans délai n'entrainent jamais de cicatrice, mais
des hyperpigmentations, si vou	avez la peau claire : elles disparaissent après quelques jours d'exposition solaire, us avez la peau mate : elles disparaissent en 6 à 18 mois, rarement plus,
☐ démangeaisons : effet dérangeant gênent,	t qui régresse en quelques jours. Appelez le médecin pour les traiter si elles vous
☐ hématomes (bleus) : régressent sp	ontanément. Peuvent traduire un trouble de la coagulation ou la prise d'aspirine,
•	t douloureuse (paraphlébite) : effet considéré comme anodin mais il faudra réduire
les doses pour l'éviter. Prévenez le me	édecin.
Effets secondaires rares et permane	e <u>nts</u> :
$\ \square$ Le laser est dangereux pour les yeu	ux : ne retirez jamais vos lunettes ou protections oculaires sans autorisation
préalable.	
	es 1 à 2 cas sur 10 000. Elles résultent soit d'une brûlure du 2 nd degré profond causée Complication d'une brûlure superficielle mal soignée ou soignée trop tard.
Stimulations paradoxales :	
\square Une augmentation de la pilosité es	st possible sur les zones où le laser est passé et 2 millimètres autour.
	rertaines parties du corps (cou et dessous du menton, pommettes, joues, décolleté,
bras, épaules et dos chez les hommes	s), rarement d'autres zones.
En faisant une épilation laser, vous a	cceptez ce risque
l'ai lu at compris(a) toutas las infor	mations qui m'ant átá prásantág quant do signar sa consentament. L'appartunitá
de poser des questions m'a toujours	mations qui m'ont été présentée avant de signer ce consentement. L'opportunité s été donnée
Patient	Date